


*Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
Fundación H. A. Barceló
Sede La Rioja*

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
XVI JORNADA CIENTIFICA
RESOLUCION HCS Nº 8345

08 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Libro de Resúmenes
Programa de la Jornada



AUTORIDADES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD "FUNDACIÓN H. BARCELÓ"

Rector: Prof. Dr. Héctor A. Barceló

Vicerrector: Lic. Axel Barceló

Decano sede La Rioja: Dr. León Malamud

Secretario Académico: Dra. Ana Costa

Secretaria de Ciencia y Técnica: Lic. Carolina O'Donnell

Coordinadora sede La Rioja: Dra. María del Carmen Díaz Ariza

Hora	PROGRAMA
08.30	Acreditación
09.00	Apertura de la Jornada
09.15	Conferencia inaugural "Riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad metabólica" a cargo del Dr. Silvio Schaiier. ¹
10.30	Break
11.00	Charla "Conflicto de intereses en investigación" a cargo del Dr. Rafael Aredes ²
12.00	Comunicaciones orales: Temas libres en Investigaciones - Trabajos de Investigación Finales de carreras de grado. Coordinación: Lic. Dra. Adriana Lanari – Lic. Viviana Stirnemann
13.30	Break
14.00	Comunicaciones orales: Temas libres en Investigaciones - Trabajos de Investigación Finales de carreras de grado y post grado Coordinación: Dra. Valeria Cuffia – Lic. Marcel Bue. – Lic. Graciela Juárez Dr. Daniel Ruiz
15:30	Presentación de posters. Ronda por áreas. Coordinación: Dra. Ana Costa, Dr. Hugo Francés Maza, Dr. Adolfo Vega, Dr. Hugo Góngora, - Dr. Gordillo Nicolas
18:00	Entrega de premios. Cierre a cargo de la Coord. de SCyT, Dra. María del Carmen Díaz Ariza.

- 1) Director de la Carrera de Médicos Especialistas en Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, Sede Hospital Italiano de Buenos Aires. Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
- 2) Especialista en Medicina interna, Especialista en Medicina Nuclear, Especialista en Medicina Legal, Magister en Salud Pública, Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud UNCA. Docente evaluador CONEAU.

INDICE

Nº	TITULO	Pag.
1	Relaciones Objetales y Vínculos Interpersonales: Personalidad Borderline. Lic. Juan Albarracín. IUCS Fundación H. Barceló- Carrera Lic. en Psicología.	6
2	Intereses que intervienen en el Proyecto de Vida del Adulto Mayor. Lic. Alejandra del V. Tutino. Maestría en Gerontología Clínica- IUCS Fundación H.A. Barceló.	6
3	La intervención Kinésica en neuropatías periféricas inducidas por la quimio terapia N.I.Q. Lic. Juárez M. Graciela. - IUCS Fundación H. A. Barceló. Carrera Lic. en kinesiología.	7
4	Estudio de aceptabilidad de un producto natural utilizado como endulzante a base de yacón con contenido en fibra, macro y micronutrientes. Lic. Jaime Alicia Alejandra; Lic. Robledo Rafaela Roxana- IUCS Fundación H. A. Barceló. Carrera Lic. en Nutrición.	7
5	Análisis de la prevalencia en casos de celiaquía en la ciudad de Chilecito y estado nutricional en relación con la adherencia al tratamiento dietoterapico durante el año 2018. Lic. Romero Brenda Sofía; Lic. Bersezio Micaela. IUCS Fundación H. A. Barceló. Carrera Lic. en Nutrición.	8
6	Nivel de conocimiento y actitudes entorno a la donación voluntaria y habitual de sangre en las facultades de derecho y ciencias de la salud, UNCA año 2019-2020 Carrizo. L, Aredes R.; Reartes C.; y otros. Facultad de Ciencias de la Salud UNCA.	8
7	Utilidad de la Capilaroscopia en el Dco de Enfermedades Reumáticas y/o EAS – Dr. Flores, Juan A; Dra. Meinardi, Monica. Servicio de Reumatología HEVB La Rioja	9
8	Aplicación de nuevas tecnologías en las actividades de vigilancia, evaluación y control del Chagas. Dr. Villa Micó H. D.; Dr. Bazán H. E.- Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud Pública de La Rioja.	9
9	Brote de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) en la Localidad de Desiderio Tello. Dr. Bazán, H. E.; Dr. Villa Micó, H. D.; Dr. Ranalli, S.- Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud Pública de La Rioja.	10
10	Estudio macroscópico y microscópico de lactobacilos en dentina careada de adultos de La Rioja. Dra. Rita Esther Pautasso de Fuentes, Dra. A. Soloaga, Dra. Patricia Córdoba, Dra. Diana Pereyra.- UNLaR.	10
11	Registros de cestodes (Cestoda: Cyclophyllidea) en roedores y marsupiales de la Provincia de La Rioja, Argentina. Dra. Chemisquy, M.A, Dra. Fariñas Torres, T., Robles M.- Centro Regional de Inv. Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), UNLaR, UNCa, SEGEMAR, CONICET. Dpto. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNLaR- CEPAVE, CCT-LA PLATA-CONICET/UNLP.	11
12	Costo-Beneficio de la Participación Comunitaria en la Detección de Insectos Vectores que Afectan a la Salud Humana. Dra. Abrahán L.B., Dr. Cavallo M.J., Dra. Amelotti I.- CRILAR-CONICET; CITCA-CONICET; UNLaR.	11
13	Prevención y Pesquisa de la Enfermedad de Chagas en la Zona Sanitaria VI de la Pcia. de La Rioja. Bq. Rodríguez, J; Bq. Albornoz, C.- Hosp. Luis Pateur.	12
14	Tratamientos kinésicos para biotipos cutáneos. Lic. Eugenia Tutino- IUCS Fundación H.A. Barceló- Carrera Lic. en Kinesiología.	12
15	Rol del kinesiólogo en la recuperación de trastornos postparto con técnicas hipopresivas. Lic. María Neyra. IUCS Fundación H. A. Barceló- Carrera Lic. en kinesiología.	13
16	Epicondilitis. Tratamiento tradicional comparativo con tratamiento con punción seca. Lic. Nicolás Escudero. Trabajo final Integrador. Carrera Lic. en Kinesiología. IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	13
17	Adherencia al tratamiento en pacientes con patologías crónicas en La Rioja, capital, 2019. Lizárraga Rocío, Gastón Javier Abraham, Carla E. Suarez. – IUCS Fundación H. A. Barceló- Cursantes Carrera de Medicina.	14
18	Mortalidad en pacientes jóvenes. Identificación de casos en pacientes menores de 40 años. Juan Andrés Ávila Quiroga, Daniel David Martínez, Gustavo Ariel Paz, Marcos Quispe. – Cursantes Carrera Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	14
19	Nivel de empatía en estudiantes de ciclos clínicos de la carrera de medicina del IUCS Fundación Barceló-sede La Rioja. Matías Gabriel Chehuan, Nicolás Rovaletti.- IUCS Fundación H. A. Barceló- Cursantes Carrera de Medicina.	14

20	Valoración de la formación docente y evaluación de los aprendizajes en el nivel superior, de la carrera de hemoterapia, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Catamarca, año 2018. Dr. Aredes, Rafael- UNCA	15
21	Parto pre termino. Relación con el embarazo adolescente. Luciana B. Carrasco; Florencia Anabella Nieto; Brenda M. Rodríguez López; Myriam de los A. Zurita Brunello. –Hosp. De la Madre y el niño. La Rioja 2019- Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	15
22	Síndrome de superposición Lupus Eritematoso sintético y hepatitis autoinmune. OVERLAP SYNDROME. Dr. Juan Antonio Flores; Dra. Meinardi, Mónica. Servicio de Reumatología- HEVB. LR.	15
23	Enfermedad de Berger. Purpura persistente. Nefropatía IgA. - Dr. Juan Antonio Flores; Dra. Meinardi, Mónica. Servicio de Reumatología- HEVB. LR.	16
24	Enfermedad ocular en pacientes diabéticos, diagnóstico, tratamiento y evolución. - Natalia Soledad Alonso Vila; Luis Esteban Fleming Saravia, Ricardo Antonio Urtubey. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	17
25	Retinopatía en el adulto, características clínicas de presentación y estadificación para evaluar el grado. Daniel Sarquis; Fiama Carolina Santos Da Conçencao; Damián Emanuel Tejerina. Cursantes Carrera Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló. FUNDANO LA RIOJA.	17
26	ASMA: polimorfismos relacionados con la predisposición a la patología en niños de Córdoba. Rodríguez M; Dra. Orellana J; Skrie V; Pogonza E; Muiño J C; Lauria M J; Blanco A; Pereira B M I- HOSP. DE NIÑOS DE CORDOBA.	17
27	Pie diabético, intervención terapéutica quirúrgica y hemodinámica con angioplastia. M. Lourdes Altamiranda; Paula Melina Amaya; Carolina R. Brandan; Marianela Corona. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. La Rioja	18
28	Apendicitis aguda pediátrica. María José Ángeles, Mercedes Giménez, Roció Guchea, Samanta Quinteros. - Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	18
29	Neumonía en pacientes adultos hospitalizados. Clínica, clasificación y motivo de egreso. Juan Estévez Robles; Ignacio Ponce de León; Christian Sotelo; Gonzalo Zarate. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. La Rioja	19
30	Prevalencia de macrosomía en neonatos. Factores de riesgo que conllevan a la enfermedad. Agustina Rocío Alarcón; Rosilene Lima Cavalcante; Fagner De Brito Pereira; Valentina Andrea Naveas Hermosilla. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. de la Madre y el Niño.	19
31	Estadística de las infecciones por escabiosis en niños de hasta 15 años desde el año 2012 al 2019. Valeria López; Héctor Claudio Servant. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. CAPS Nancy Gallegos, La Rioja.	19
32	Paederismo. Una patología emergente en La Rioja L Ballarino1 , C Bizzotto2 , E Euliarte1 , G Bonini1 , SG Rodríguez Gil3. Ministerio de Salud Publica La Rioja.	20
33	TEST FRINDRISK en alumnos del IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. De Araújo Alves, Jessyca Tamyres; Gomes Borges, Cristiany Sabriny.-Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	20
34	Calidad de vida en la anticoagulación, impacto en lo cotidiano del paciente. Henrique Faustino Periné; Víctor Ferras; Fredy Emanuel Díaz. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	21
35	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en edad escolar primaria del AREA CAPS BENITO MONTOYA. - Maximiliano Enrique Carrizo Rearte; Carla Irina Castillo. Cursantes Carrera Lic. en Nutrición.- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	21
36	Bronquiolitis en pacientes de pediatría. - Teresa Gabriela Escobar Cáceres, María Macarena Manrique; Luis Guillermo Panozo Tuquina; Evelin Wagner; Laura A. Allende. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el Niño.	21
37	Quemaduras en pacientes pediátricos menores de 14 años. -Angélica María Angulo Zuleta; Macarena Agostina Autalan Núñez; Fernando Paredes; Guadalupe Soto. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el Niño.	22

38	Quemaduras accidentales por fricción en pacientes pediátricos entre 2 a 12 años. -Ana Laura Arguello; Fernando Gabriel Bulacio; Ana Carolina Cardozo. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el Niño.	22
39	Retinopatía en recién nacidos prematuros y sus características.-Carla Rocío Carrizo; Diamela Cristal Carrizo; Indira Estofe Sousa.-Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	22
40	Cáncer de próstata, incidencia, estratificación según sus metástasis. -Nicolás J. Ibaceta, Juan F. Kollrich, Norberto Bravo.-Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	22
41	Neumonía adquirida en la comunidad, aspectos clínicos y de laboratorio.-María Pía Bissutti; Milton Colque; Mariana Fernández Boca Negra.-Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	23
42	Pacientes duales, factores de riesgo, clínica y tratamiento. -Ana Paula Grandi Rivera; Marcela A. Rodríguez; Sabrina Rojo; Samanta S. Santillán. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB.	23
43	Síndrome coledociano, características clínicas, diagnóstico y tratamiento. Federico Quiroga, Maximiliano Tovar; Carlos Saravia Ibáñez, Hernán Josso. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	24
44	Incidencia y prevalencia de pie diabético en un hospital público. -Núñez, Gabriela Florencia; Rivadeneira Cinthia Yohana; Trejo Filipovich Carla Elina. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	24
45	Alacranismo. Prevalencia y evaluación de las características electrocardiográficas y de laboratorio. - Fraccarolli Lucas Javier; Sanguineti Naharro Natacha Silvina. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	24
46	Hipertensión arterial, diabetes, enfermedades autoinmunes y otras. - Dantur Adib Bernardo, Estremadoiro Micaela Patricia. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	25
47	Parasitosis. Determinación, prevalencia en población pediátrica. -Daza Rivera Gabriela; Scarabotti María Florencia. -Cursantes Carrera de Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. CAPS Ofelia de Lozada. La Rioja.	25
48	Palivizumab "profilaxis para la infección grave por virus sincitial respiratorio en prematuros de alto riesgo". Castro Lujan, Juan Pablo Daniel; Machado, Rodrigo de Carlo; Villca Quispe, Cristian Alfredo. - Cursantes Carrera de Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.	25

RESUMENES DE TRABAJOS CIENTIFICOS

1. RELACIONES OBJETALES Y VÍNCULOS INTERPERSONALES: PERSONALIDAD BORDERLINE.

Lic. Albarracín Juan. IUCS Fundación H. A. Barceló- sede La Rioja.

Introducción.

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) conlleva inestabilidad en las relaciones interpersonales (RI) y es esta característica el punto de partida para entender la patología; con sus esfuerzos para evitar el abandono, el miedo a la separación, rechazo y pérdida, que ocasionan cambios afectivos, cognitivos, y comportamentales. Se investigan también las "Relaciones Objetales" (RO), donde coincidimos está la génesis del trastorno.

Metodología.

Para explorar las RI y RO se diseñó una Batería Psicodiagnóstica, con evaluaciones de alcance diagnóstico específico para inferir acerca de estas variables:

- Dos Personas.
- Familia Kinética.
- TRO.
- MMPI-2.

Conclusión.

- Los paradigmas de la psicología coinciden al analizar la génesis del trastorno Borderline.
- Las RO determinan las RI. Pero se aprecia que existe una correlación entre los criterios diagnósticos DSM-IV para el TLP, partiendo de tomar las RI.
- Existe un criterio diagnóstico que define lo vincular y el perfil general del TLP: Esfuerzos para Evitar el Abandono.

Resultados.

MMPI-2.

Criterios diagnósticos que determinan vincularmente al TLP:

- Esfuerzos para Evitar el Abandono.
- RI Inestables.
- Impulsividad.
- Inestabilidad Emocional.

Dos Personas.

"Análisis Interfiguras":

- Escaso contacto y comunicación: distancia interpersonal. Patrones gráficos ligados al temor a la interrelación y al rechazo. Temor que lleva a los intentos para evitar el abandono.
- Cercanía entre figuras; denota el vínculo fantaseado en el TLP: donde no exista el abandono.

Familia Kinética.

Campo de RO: vínculos primarios.

- "Personajes Incluidos": Ausencia de la figura propia. La omisión propia es indicadora de conflicto, da indicios del sentimiento predominante: no pertenencia, inadecuación.
- "Secuencia General" del grafismo: últimos lugares al graficar la figura propia. Conflictos dentro de la familia; el sujeto toma distancia por los sentimientos de inadecuación con respecto al círculo familiar.

TRO.

- Apercepción: diversos climas emocionales, pero tendencia hacia la Unión Afectiva Positiva (vinculo deseado).
- Contenido de RO: Ansiedad Persecutoria, refleja temor a la interrelación. Ansiedad Depresiva como defensa para buscar la unidad afectiva y no el distanciamiento.

Palabras claves: trastornos límite de la personalidad-borderline.

2. INTERESES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO DE VIDA DEL ADULTO MAYOR.

Alejandra del V. Tutino. Maestría en Gerontología Clínica- IUCS Fundación H.A. Barceló sede La Rioja.

Introducción.

Expectativas, inquietudes y proyecto de vida del Adulto Mayor, constituyen temáticas relativamente nuevas en ámbitos de estudio y práctica profesional en general y en la psicopedagogía en particular.

Diversos intereses intervienen en un proyecto de vida del adulto mayor; por lo que, relacionarlos con las condiciones sociodemográfica, familiares y educativas, es una valiosa oportunidad para promover espacios de reflexión y análisis. Esta relación es el objetivo general de este trabajo.

Se alcanzó este objetivo, a través de una investigación de diseño transversal y descriptivo, mediante una entrevista diseñada para tal fin, aplicada a 200 personas de ambos sexos de entre 65 y 69 años que residen en distintas zonas de la ciudad Capital de La Rioja durante el año 2017. Esto, en un recorrido histórico de la vida del adulto mayor desde la dedicación laboral que realizaba, las actividades que desarrollaba, lo que le interesaría hacer, lo que no, y las limitaciones que le impidieron realizar esos intereses deseados.

La familia y la salud se constituyen como los mayores intereses del adulto mayor. Mientras que la principal

limitación para la realización de actividades que les interesa realizar, es, precisamente, la salud.

Estos resultados marcan una impronta para el abordaje profesional preventivo y terapéutico asistencial. Y es un valioso dispositivo generador de futuras líneas de investigación en el desafío permanente del hacer psicopedagógico.

Aquí entonces, uno de los tantos desafíos para la psicopedagogía en relación con el adulto mayor: el enseñar a envejecer como eje central de la educación para quienes transitan esta etapa evolutiva.

El modo, las herramientas y los dispositivos con los que cuenta el adulto mayor desde su salud integral se constituyen como recursos que promueven su posicionamiento ante el aprender; y, por lo tanto, el punto de partida para el diagnóstico y planificación de la tarea psicopedagógica.

Palabras claves: proyecto de vida – adulto mayor – intereses de un proyecto de vida- limitaciones para alcanzar los intereses deseados en un proyecto de vida-

3. LA INTERVENCIÓN KINÉSICA EN LAS NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS INDUCIDAS POR LA QUIMIOTERAPIA N.I.Q.

Lic. María Graciela Juárez. IUCS Fundación H. A. Barceló-sede La Rioja.

Introducción.

Con esta investigación se busca conocer una de las complicaciones con mayor prevalencia en pacientes oncológicos durante la quimioterapia como el desarrollo de neuropatías periféricas (parestias, debilidad muscular). Mencionar la palabra cáncer implica en la sociedad una sensación de temor especialmente en aquellos a quienes se les diagnostica. No sólo los pacientes tienen que asumir su diagnóstico, sino que también las complicaciones que presentan durante los tratamientos. Desde la perspectiva integral, en los casos graves con lesión en el SNP que requieran equipos interdisciplinarios especializados en la rehabilitación de neuropatías periféricas formados por psicólogos, médicos, kinesiólogos. Estos últimos se encargan de evaluar las características del paciente para una mejor elección de la rehabilitación oncológica, cuyo objetivo es preservar, mantener, desarrollar y restaurar la integridad de los órganos cinético-funcional, como prevenir las alteraciones causadas por el tratamiento médico.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, se centró en la descripción de neuropatías periféricas en pacientes oncológicos, además de la intervención kinésica en los efectos secundarios que ocasionan

dicho tratamiento. La recolección de datos fue mediante la observación de historias clínicas, y fichas neurokinesicas que se realizaron a pacientes oncológicos en los cuales se observó si han recibido o no atención kinésica durante su tratamiento.

Muestra:

La muestra seleccionada se realizó en 70 pacientes oncológicos correspondientes a los tipos de CA que más prevalecen en la clínica H.O.P.E. Este trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la importancia del rol del kinesiólogo y su acción durante el desarrollo de neuropatías periféricas.

Conclusión:

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se demostró que el kinesiólogo tiene intervención paulatina en las neuropatías del tipo sensitivo-motoras, sin ser el objeto central del abordaje kinésico, en los cuales se realizan movilización de tejidos(drenaje linfático) sobre todo en los CA de mama y pulmón, es importante evidenciar además que la rehabilitación oncológica es otro campo importante en la kinesiología que permita desarrollar profesionales, como así también un abordaje multidisciplinario en mejor la calidad de vida. **Palabras claves:** neuropatías periféricas- kinesiología en pacientes oncológicos- quimioterapia.

4 .ESTUDIO DE ACEPTABILIDAD DE UN PRODUCTO NATURAL UTILIZADO COMO ENDULZANTE A BASE DE YACÓN CON CONTENIDO EN FIBRA, MACRO Y MICRONUTRIENTES.

Lic. Jaime Alicia; Lic. Robledo Rafaela. IUCS Fundación H. A. Barceló-sede La Rioja.

Introducción.

Las nuevas tendencias en la alimentación han llevado al hombre a un mayor consumo de alimentos que concentran niveles altos de azúcares refinados y grasas saturadas. Consecuencia de ello, más predisposición a enfermedades no transmisibles. Con el siguiente trabajo se pretendió priorizar el uso de fuentes naturales en la alimentación promoviendo hábitos alimentarios saludables y cubriendo parte de requerimientos nutricionales a partir de la obtención y utilización de un endulzante a base de Yacón, planta que produce tubérculos.

El diseño aplicado fue observacional, transversal y descriptivo.

Muestra.

Muestreo: probabilístico de conveniencia

Muestra Poblacional:100 alumnos, ambos sexos, sin diferencia de edad, pertenecientes a Medicina y Nutrición, de la Facultad H.A. Barceló La Rioja.

Materia prima: Tubérculos de Yacón de Bárcena, Provincia de Jujuy, como endulzante.

Degustación: se utilizó una escala hedónica de 5 puntos con atributos evaluados como: Aroma, color, sabor, Textura, Aceptabilidad.

La Muestra líquida utilizada: Té endulzado con 45 gr de endulzante por litro de preparación.

Prueba sólida: Bizcochuelo endulzado con 50 gr de endulzante por Kg de preparación.

Resultados: Prueba Hedónica: 52 % de la población le gustó el Color que otorga el endulzante a un bizcochuelo, 76 % le gustó el Sabor, 82 % de Aceptabilidad.

En preparaciones líquidas al 44 % le gustó el Color que le otorga el endulzante al té, al 54 % le gustó el Sabor, 90 % de Aceptabilidad.

Conclusión.

Elaboración del producto, sencilla de realizar.

Prueba hedónica: sin grandes diferencias entre ambas preparaciones endulzadas.

En comparación de endulzantes nutritivos como Miel, Sacarosa, Estevia, endulzantes artificiales, nuestro producto ofrece nutrientes como FOS, Vitamina C, Fosfatos, bajo Valor Calórico y bajo Índice Glucémico.

Palabras claves: planta yacón-endulzantes naturales.

5. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA EN CASOS DE CELIAQUÍA EN LA CIUDAD DE CHILECITO Y ESTADO NUTRICIONAL EN RELACIÓN CON LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETOTERAPICO DURANTE EL AÑO 2018.

Lic. Romero Brenda Sofía; Lic. Bersezio Micaela. IUCS Fundación H. A. Barceló-sede La Rioja.

Introducción.

La enfermedad celíaca o enteropatía por gluten es una afección inflamatoria que daña la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia al gluten. En la provincia de La Rioja cuenta con diferentes asociaciones que brindan asistencia médica y alimentaria a la población celíaca cada una de ellas cuenta con su propio padrón de registro que no representa a la provincia de La Rioja ni a la Ciudad de Chilecito, a las cuales solos asiste un mínimo porcentaje de la misma. Con la realización de este trabajo se pretende obtener datos específicos de la población celíaca en la ciudad de Chilecito y su estado nutricional en relación con sus hábitos alimentarios con la finalidad de generar datos estadísticos y epidemiológicos que puedan ser aplicados en acciones para mejorar la situación de salud de las personas pertenecientes a la Ciudad de Chilecito y

paralelamente, que sea aplicado en el resto de la provincia.

Materiales y métodos.

Objetivo general: Analizar la prevalencia de casos de personas celíacas de la ciudad de Chilecito entre 6 a 80 años, y valorar el estado nutricional en relación con sus hábitos alimentarios durante el año 2018.

Objetivos específicos: Identificar la prevalencia de casos de enfermedad celíaca. Valorar el estado nutricional de la población estudiada. Indagar sobre su adherencia al tratamiento actual. Evaluar los conocimientos que tiene la población sobre la enfermedad celíaca y su calidad de vida. Indagar sobre los beneficios y ayudas que brinda el estado y cuál es la población beneficiaria.

El diseño empleado es tipo Transversal y Descriptivo correlacional. Universo de 29.459 habitantes, entre 6 a 80 años, ambos sexos pertenecientes a la ciudad de Chilecito. La Obtención de la Muestra es no probabilística por bola de nieve comprende 41 celíacos detectados en el presente estudio.

Resultados obtenidos: Se detectó 41 personas celíacas ya diagnosticadas y 2 sin diagnosticar. El 67% eran personas adultas. El sexo femenino prevalece con un 83%. El estado nutricional presenta un 36% de personas con sobrepeso y un 48% Normo peso.

Conclusión.

Finalmente es de considerar este trabajo de investigación tanto para salud pública como para la ciudad de Chilecito debido a que proporciona datos relevantes sobre la patología en estudio.

Palabras claves: celiacía- tratamiento dietoterapico-Chilecito, La Rioja, Argentina. -

6. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES EN TORNO A LA DONACION VOLUNTARIA Y HABITUAL DE SANGRE EN LAS FACULTADES DE DERECHO Y CIENCIAS DE LA SALUD, UNCA AÑO 2019-2020

Dr. Carrizo. L, Aredes R.; Dr. Reartes C.; y otros. Facultad de Ciencias de la Salud UNCA.

Introducción

El presente proyecto recabará información, en la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, sobre actitudes, motivaciones y mitos hacia la donación voluntaria y habitual de sangre **Objetivo:** Comparar y analizar el nivel de conocimiento y actitudes en torno a la donación voluntaria y habitual de sangre en las facultades de Derecho y Ciencias de la Salud, UNCA año 2019-2020.

Materiales y Métodos.

Estudio: descriptivo cualicuantitativo y de corte prospectivo. Los datos serán obtenidos del área de

personal de cada unidad académica. Como instrumento se utilizará una encuesta de carácter anónimo, con un cuestionario de preguntas semiestructuradas. Las escalas empleadas en el cuestionario serán de tipo nominal y ordinal, de tal manera que el análisis se realizará con base en frecuencias absolutas y relativas. Asimismo, se aplicará un análisis de χ^2 para determinar la significancia estadística de algunos resultados. Para el análisis de los datos se utilizará los métodos estadísticos: porcentajes, media, mediana, desviación estándar, r de Pearson, y las pruebas de significación estadística t de Student y "F" de Fisher. En la parte analítica las comparaciones de proporciones para variables categóricas se realizarán mediante el Test Xi – cuadrado, en el caso de varias categorías se utilizará ANOVA.

Resultados.

Los resultados en números absolutos y relativos se traducirán en sistemas de tablas y representación de cuadros y gráficos de las distintas variables, procesos indicadores que se hayan manifestado como consecuencia del estudio.

Conclusiones que surgirán de los resultados, servirá para comparar conocimientos y actitudes entre dos facultades, una de salud en teoría con mayor información que de Derecho, no familiarizado con el tema. Que servirá para fortalecer y eliminar mitos y creencias y lograr mayores donantes de sangre, segura, una necesidad imperiosa en la población.

Palabras claves: donación de sangre- derechos-

Email:ovejero44@yahoo.com.ar

7.UTILIDAD DE LA CAPILAROSCOPIA EN EL DCO DE ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y/O EAS –

Dr. Flores, Juan A; Dra. Meinardi, Mónica. Servicio de Reumatología Hosp. Dr. Enrique Vera Barros- La Rioja

Introducción.

La capilaroscopia del pliegue ungueal (CPU) consiste en la observación in vivo de la microcirculación capilar.

Objetivo: describir alteraciones capilares en pacientes que consultaron en el Servicio de Reumatología.

Materiales y métodos: Pac con F. de Raynaud en estudio descriptivo, retrospectivo, cualitativo de los patrones capilaroscópicos.

Resultados.

CPU de 32 (30 mujeres), con FR primario con una media de edad $46,6 \pm 17,5$ años siendo en 2 (10%) pacientes. Los patrones en la CPU hallados fueron normales en 45% y patológicos en 25 %. Dos de los pacientes con esclerosis sistémica presentaron CPU

patológica, de estos, 1,8% correspondió a un patrón esclerodermiforme. en 85 % fue patrón inespecífico. -

Técnica.

Paciente en reposo 15 minutos, en ambiente tranquilo y a temperatura entre 20 °C y 23 °C.

Patrones capilaroscópicos.

Patrón normal.

Patrón tortuoso.

Patrón esclerodermiforme.

Aplicabilidad clínica

-Fenómeno de Raynaud

-Esclerosis sistémica

-Dermatomiositis

-Lupus eritematoso sistémico

-Enfermedad mixta del tejido conectivo

-Síndrome antifosfolípido

Discusión.

La CPU es una técnica no invasiva, de fácil realización y bajo costo que permite observar la microcirculación in vivo y con cierta correlación clínica.

Conclusiones.

La CPU contribuyó en distintos aspectos en el estudio del fenómeno de Raynaud y de enfermedades autoinmunes. La detección de un patrón esclerodermiforme fue altamente sugestiva de la presencia de una enfermedad autoinmune sistémica. La CPU, junto a los hallazgos clínicos y marcadores biológicos, adquiere valor y especificidad en el diagnóstico, debiendo formar parte de la valoración de pacientes con fenómeno de Raynaud y sospecha clínica de enfermedades autoinmunes sistémicas.

8.APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL CHAGAS.

Villa Micó H. D.1; Bazán H. E.1.

1Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud Pública de La Rioja.

Introducción.

En la provincia de La Rioja, el equipo técnico del Programa Provincial de Vectores, utiliza el formulario en papel Chagas 6 (Ch6), para desarrollar la vigilancia, evaluación y control de la enfermedad durante el trabajo de terreno desplegado en zonas endémicas. En Argentina no encontramos experiencias de usos de nuevas tecnologías en las actividades de campo del programa. Con este trabajo se plantea describir las características del uso de un formulario digital en las actividades de vigilancia del Chagas y su influencia en el ciclo de la información.

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, planificándose las actividades de campo durante el

período enero-diciembre 2018, en los departamentos Arauco, Castro Barros, Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martín. El instrumento aplicado fue un formulario digital con variables contenidas en el Ch 6. Se requirió una notebook y cinco tablets, utilizándose el software Epi Info™ 7 en la generación, recolección, procesamiento, georreferencia y análisis del formulario digital.

Resultados

Durante el período de estudio se planificaron 5700 viviendas, de las cuales se evaluaron 2621 (46 %), encontrando triatominos en 392 (15 %), con índices de infestación promedio intradomicilio de 2 % y peridomicilio de 10,3 %, por lo que se procedió al tratamiento químico. El análisis entomológico obtuvo 2 viviendas (0,2 %) con presencia de triatomas positivas para *Tripanosoma cruzi* en peridomicilio. El 100 % (15) del equipo técnico utilizó el instrumento, con un ciclo de la información diario, acorde a la planificación en terreno.

Discusión.

Con el formulario digital se actuó sobre la oportunidad, reduciendo aproximadamente 45 a 60 días el ciclo de la información en papel; sobre la calidad del dato, resolviéndose dificultades como la duplicación y los errores de carga. Con respecto a la periodicidad, se sistematizó el resguardo diario, evitando la pérdida de la información y fomentando la adherencia del equipo técnico.

9. BROTE DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA) EN LA LOCALIDAD DE DESIDERIO TELLO.

Bazán H. E.1; Villa Micó H. D.1; Ranalli S.1
1 Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud Pública de La Rioja.

Introducción.

Las ETA son una importante causa de morbimortalidad a nivel mundial y constituyen un desafío para la salud pública. El 11 de febrero de 2019, la Dirección de Epidemiología, recibe una notificación del Hospital René Favaloro, de la Localidad de Desiderio Tello, sobre la presencia de 33 personas con síntomas gastrointestinales que participaron de una actividad. Con este trabajo se plantea describir inicialmente el brote y elaborar un estudio analítico.

Material y métodos.

La primera etapa del brote fue descriptiva, transversal, con definición de casos sospechosos y confirmados, criterios de inclusión y exclusión, y caracterización de los casos sintomáticos por medio de fichas de

investigación de brote. En la segunda etapa se desarrolló un estudio de cohortes retrospectivo, aplicándose fichas de investigación al total de participantes de la actividad recreativa.

Resultados.

La población de estudio fue de 138 personas, presentando 33 sintomáticas y 105 asintomáticas. La curva epidémica por fecha de inicio de síntomas (FIS), determinó un brote por fuente común, puntual, de exposición simultánea y un período de incubación promedio de 72 horas. La mediana de edad de los casos sintomáticos fue de 10 años, con leve predominio del sexo masculino (58%) y presentando la diarrea como síntoma principal (100%), siendo en 3 casos con sangre. Se planteó como hipótesis la exposición a *Shigella* sp., *E. coli* sp. o *Salmonella* sp.

La etapa analítica arrojó una tasa de ataque general de 24%, orientando como posibles alimentos implicados a la hamburguesa y el agua, con medidas de asociación (RR) de 2,1 y 1,3 respectivamente.

Conclusión.

La sospecha del alimento implicado fue la hamburguesa, ya que aquellas personas que ingirieron este alimento, tuvieron dos veces el riesgo de padecer la enfermedad que los que no la consumieron. Además, se realizó examen de heces de las personas afectadas con cultivo positivo para *Shigella* sp. y análisis bromatológico del agua de consumo con presencia de *E.*

Palabras claves: enfermedades por alimentos- ETA. -

10. ESTUDIO MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DE LACTOBACILOS EN DENTINA CAREADA DE ADULTOS DE LA RIOJA.

Rita Esther Pautasso de Fuentes; A. Soloaga; Patricia Córdoba; Diana Pereyra. UNLaR.

Introducción.

La caries es la enfermedad de los tejidos duros del diente. El 39% de la población mundial, según la OMS, tienen caries. Dentro de los factores principales en el origen de la caries es la placa bacteriana. En caries superficiales hay predominio de *Streptococcus mutans* y *Streptococcus sobrinus*. A medida que la caries profundiza encontramos Lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias Gram +, viven en un pH de 5. Son acidógenas y acidúricas, son anaerobias facultativas. La micro biota de la caries dental difiere entre diferentes sitios geográficos. No encontramos antecedentes de la caracterización de Lactobacilos relacionadas con lesiones de caries avanzadas en La Rioja, Argentina. Objetivo: aislar e identificar lactobacilos en adultos de ambos géneros de La Rioja.

Metodología.

Población de adultos hombres y mujeres. Se selecciona el diente con caries. Aislamiento relativo con rollos de algodón. Con cucharillas de Black estéril se retira la porción superficial de la caries. Se desecha esta dentina. Con nueva cucharilla estéril se saca la porción subsiguiente y se deposita en tubo estéril que contiene caldo MRS como medio de transporte. Las muestras se obtienen de pacientes que concurren a la Supervisión de Odontología dependiente de Salud Pública de la Provincia de La Rioja. En el Laboratorio de Microbiología de la UNLAR se realiza el análisis de las muestras de dentina cariada. El paciente seleccionado firma el consentimiento informado.

Se obtiene la caracterización microbiológica según la técnica de Capuccino y Sherman.

Resultados.

Se obtuvieron las características macroscópicas y microscópicas de los lactobacilos estudiados. Se determinó que las unidades formadoras de colonias (UFC) lactobacilos por unidad de caldo de cultivo es 10 a la 8, valor coincidente con la bibliografía de referencia consultada.

Conclusiones.

Permite ver las poblaciones de riesgo para un mejor control de la enfermedad de la caries en La Rioja, Argentina.

Palabras claves: lactobacilos- caries- Capuccino-

11. REGISTROS DE CESTODES (CESTODA: CYCLOPHYLLIDEA) EN ROEDORES Y MARSUPIALES DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA.

Chemisquy, M.A. (1,2), Fariñas Torres, T. (1), Robles M.R. (3)

(1) Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), UNLaR, UNCa, SEGEMAR, CONICET. (2) Dpto. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). (3) CEPAVE, CCT-LA PLATA-CONICET/UNLP.

amelych80@gmail.com.

Introducción.

Varios grupos de cestodes utilizan las interacciones predador-presa para completar su ciclo de vida. Los estadios adultos parasitan cánidos y félidos, mientras que los roedores, lagomorfos y ocasionalmente humanos pueden actuar como hospedadores intermedios. Trabajos previos han reportado cestodes en roedores nativos e introducidos de la provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento son pocas las especies nativas para las que hay registros de este grupo de parásitos.

El objetivo de este trabajo es informar los hallazgos de cestodes encontrados en distintas especies de

roedores silvestres y pequeños marsupiales de la provincia de La Rioja. La zona de muestreo abarcó diversas localidades de los departamentos Castro Barros, Sanagasta y Capital, realizados en diferentes épocas del año a lo largo de los últimos dos años. Las vísceras fueron fijadas en alcohol y se analizó el hígado y tracto digestivo en busca de parásitos. En total se analizaron 56 individuos, encontrándose cestodes en 9 de ellos (prevalencia= 16%). Se encontraron *Strobilocercus fasciolaris* en *Akodon simulator*, y *Graomys griseoflavus*, *Taenia* sp. en *Phyllotis xanthopygus*, y cestodes inmaduros enquistados en el hígado de *P. xanthopygus*, *Graomys griseoflavus* y *Thylamys* sp. Los individuos hospedadores de estos cestodes provienen de diversas localidades: Sierra de la Punta, Pampa de La Viuda y casco urbano de Sanagasta y Anillaco (casco urbano y quebrada). Varios de los sitios donde encontramos cestodes son lugares utilizados por los pobladores para ganadería (principalmente vacas y cabras), aunque también encontramos un individuo infectado en una finca familiar, donde además de animales (incluyendo chanchos) tienen cultivo de vegetales para el consumo particular. Resta determinar los quistes inmaduros para ver si se tratan de especies de importancia zoonótica.

12. COSTO-BENEFICIO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA DETECCIÓN DE INSECTOS VECTORES QUE AFECTAN A LA SALUD HUMANA.

Abrahan L.B.1, Cavallo M.J.2, Amelotti I.1,3
1 CRILAR-CONICET; 2 CITCA-CONICET; 1,3 UNLaR.
lucianaabrahan@conicet.gov.ar

Introducción.

Triatoma infestans es el principal vector de la Enfermedad de Chagas. En La Rioja, las viviendas son evaluadas entomológicamente por brigadas del Programa Provincial de Chagas (PPCH) que se trasladan desde la Capital a zonas rurales, generando altos costos. Se define evaluación entomológica con participación comunitaria cuando se realiza por la comunidad y el PPCH solo se encarga de rociar las viviendas donde se registró la presencia de *T. infestans*. El objetivo del trabajo fue determinar la rentabilidad de la evaluación entomológica con y sin participación de la comunidad. Se seleccionaron 434 viviendas correspondientes a 9 localidades del departamento Castro Barros. Se relevó la infestación por *T. infestans* dentro de las viviendas seleccionadas involucrando a la comunidad en la detección de los triatominos en noviembre de 2017. Se capacitó a cada familia en la colecta de insectos que eran guardados en bolsas

plásticas rotuladas y retiradas luego de dos semanas, para analizar en laboratorio la presencia de *Trypanosoma cruzi*.

Metodología.

Para evaluar el costo-beneficio con ambas metodologías de campaña, se tuvieron en cuenta los insumos utilizados y los costos afrontados por el PPCH. Las comparaciones se realizaron sobre el número de viviendas visitadas y sobre el número de casas evaluadas, así como la superficie evaluada.

Resultados.

Los resultados mostraron que los triatominos no presentaron evidencia de infección por *T. cruzi*. La infestación en el área fue de 13.8% con diferencias en el riesgo relativo en distintas zonas. Con participación comunitaria se disminuyeron los costos en relación a las viviendas visitadas ($\chi^2=52.76$, $p<0.0001$) y evaluadas ($\chi^2=380.96$, $p<0.0001$) así como permitió cubrir una superficie mayor (163.9 vs 0.8 Km²). La participación de la comunidad en el relevamiento de la infestación es rentable, permitiendo que los rociados sean focalizados sobre casas infestadas y de esta forma se disminuyen costos y tiempos de intervención del PPCH.

13. PREVENCIÓN Y PESQUISA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA ZONA SANITARIA VI DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA.

Bq. Rodríguez, J; Bq. Albornoz, C. Hospital Luis Pasteur

Introducción.

La escasa llegada de atención médica en zonas rurales llevó a implementar abordajes en la Zona Sanitaria VI puesto en marcha en junio del 2018, un equipo de bioquímicos se traslada hacia zonas rurales y realiza extracciones de sangre para su análisis por dos técnicas serológicas en busca de Anticuerpos contra el *T.Cruzi*.

Metodología.

Visitas a zonas rurales: Traslado de personal de laboratorio con fines de búsqueda a través de anamnesis y antecedentes de pacientes y su grupo familiar con probable enfermedad de Chagas

Toma de muestra: extracción de sangre periférica, previo consentimiento informado de los pacientes voluntarios.

Recolección de datos: Fichas epidemiológicas con nombre y apellido, edad, antecedentes, número de documento, fecha de nacimiento y lugar de procedencia. Condiciones de vivienda y costumbres sanitarias.

Análisis de muestras: Todas las muestras obtenidas se analizaron por dos métodos serológicos HAI y ELISA.

Análisis de datos: Gráficos estadísticos.

Comunicación de resultados: Puesta en marcha del tratamiento en pacientes seropositivos.

Resultados

Hallazgos: Atendidos: 102 pacientes en junio; 66 pacientes en julio; 139 pacientes en agosto; 73 pacientes en septiembre; 136 en octubre; 77 en noviembre y 83 en diciembre. De los cuales 66 son reactivos indicando 9,76% de 676 pacientes atendidos. De los casos reactivos, 15 corresponden a menores de 36 años y 7 a menores de 18 años con posibilidad de acceder al tratamiento y de respuestas favorables al mismo.

Conclusión.

El control de Chagas necesita de acciones múltiples en viviendas y condiciones edilicias, acceso a la educación, fumigación y como ya hemos ejemplificado, la derivación de centros asistenciales con capacidad de resolver las distintas situaciones. Así pretendemos despertar un interés genuino para resolver el Chagas.

14. TRATAMIENTOS KINESICOS PARA BIOTIPOS CUTANEOS

Lic. Tutino, Eugenia. IUCS Fundación H. A. Barceló- sede La Rioja-

Introducción.

Teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, que cambia constantemente y necesita ser cuidado, amerita otorgarle la importancia que tiene: desde la salud por la relación que guarda con el medio externo y las lesiones que este provoca; y desde lo estético por la relación que guarda con la imagen de uno mismo.

Objetivo general.

Observar y planificar protocolos de tratamientos kinésicos para biotipos cutáneos.

Objetivos específicos.

Definir biotipos cutáneos, sus respectivas alteraciones y prevalencia de los mismos en la provincia de La Rioja. Describir agentes físicos fisioterapéuticos utilizados en los tratamientos kinésicos.

Relevar factores predisponentes que influyen en el desarrollo de los distintos tipos de piel.

Sugerir medidas preventivas para el cuidado de la piel.

Metodología.

Estudio: Descriptivo corte transversal. Muestra: 20 pacientes, ambos sexos, entre 18 -60 años. Unidad de Análisis: Consultorio Privado en la La Rioja. Instrumento: Fichas Kinésicas.

Resultados.

De 20 pacientes, el 55% tiene piel grasa deshidratada, el 25% piel grasa seboreica, el 10 % posee piel seca deshidratada y el 10% restante piel seca alípica.

Agentes físicos fisioterapéuticos en tratamientos: radiofrecuencia, alta frecuencia y punta de diamante (excepto en piel seca). El 80% no utilizan protector solar diario.

Conclusiones.

En zonas de clima semiárido cálido se constató el predominio de piel grasa deshidratada; el uso de radiofrecuencia, punta de diamante y alta frecuencia, son los recomendados para tratar este biotipo. La mayoría de los casos analizados no consumen suficiente agua ni utilizan protector solar a diario, siendo este fundamental para todo tipo de piel en esta región. Los resultados indican que no todos los pacientes tienen hábitos saludables y lo importante que es la intervención kinésica con recomendaciones de cuidados y tratamientos que mejoran la calidad de vida.

15. EL ROL DEL KINESIOLOGO EN LA RECUPERACIÓN DE TRASTORNOS POSTPARTO CON TÉCNICAS HIPOPRESIVAS.

Lic. María Neyra. IUCS Fundación H. A. Barceló- sede La Rioja.

Introducción.

La intención de este trabajo surge ante la necesidad de profundizar sobre la técnica hipopresiva como tratamiento en la recuperación de trastornos postparto. Durante el proceso del embarazo el tejido conectivo y muscular del abdomen, en la mujer, sufren una disfunción, lo mismo que el piso pélvico en el momento del parto. Los posibles trastornos que se dan a causa de estas lesiones son: incontinencia urinaria, prolapsos viscerales, diastasis abdominal. La fisioterapia postparto es importante para la recuperación temprana de la mujer.

El trabajo de investigación se realiza mediante estudio descriptivo-observacional.

Criterios de inclusión:

- Mujeres entre 25 y 40 años de edad
- En un periodo de postparto no inferior a 3 meses
- Que realicen técnica hipopresiva en consultorios kinésicos.

Se analizaron 70 casos de mujeres, con distintos trastornos postparto que fueron tratadas con método hipopresivo, donde el tiempo de recuperación variaba según la edad, el tipo de parto, el tipo de trastorno postparto y según la frecuencia con la que se realizaba la técnica.

Conclusión.

A través de la investigación se demostró que el tratamiento con técnicas hipopresivas, ayuda a la mejora, fortalecimiento y activación de la faja

abdominal, como así también, del piso pélvico, actuando favorablemente en la recuperación y disminución de los síntomas de los trastornos postparto.

16. EPICONDILITIS TRATAMIENTO TRADICIONAL COMPARATIVO CON TRATAMIENTO CON PUNCIÓN SECA.

Lic. Nicolás. J.A Escudero. Trabajo final Integrador. Carrera Lic. en Kinesiología. IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

La intención de este trabajo surge ante la necesidad de profundizar sobre tratamientos alternativos.

La Epicondilitis es una lesión caracterizada por dolor en la cara externa del codo., estudios recientes han demostrado que histológicamente se observa una hiperplasia angiofibroblástica.

Metodología.

El trabajo de investigación se realiza mediante estudio observacional-descriptivo. De tipo transversal: porque se procedió a la medición de los casos, en un determinado tiempo.

Criterios de inclusión:

- Personas entre 18 a 45 años de edad
- Personas de sexo masculino
- Diagnóstico de epicondilitis
- Practicado una o los tratamientos kinesiológicos
- Predisposición y compromiso para realizar el tratamiento.

Conclusión.

Se analizaron 70 casos de pacientes., la muestra se dividió en dos grupos, los que fueron tratados con punción seca, asistieron a menos sesiones y restauraron y mejoraron la movilidad del codo en 2 semanas de tratamiento 28,6% mientras que con tratamiento tradicional solo 5,7% evidenciaron alivio del dolor más rápido.

A través de la investigación, se demostró que el tratamiento con punción seca y elongación, actúa favorablemente en la recuperación de la epicondilitis, disminuyendo el dolor y recuperar la movilidad del codo.

17. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS EN LA RIOJA, CAPITAL AÑO 2019.

Lizárraga, Rocío F.; Abraham Ríos, Gastón J.; Suarez, Carla E.- Cursantes carrera Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló -sede La Rioja-.

Introducción.

La falta de adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas constituye un grave problema a la salud por lo que esta es un factor fundamental para lograr el éxito del tratamiento.

Objetivo general.

Estudiar la adherencia al tratamiento en pacientes con patologías crónicas en La Rioja 2019.

Objetivo específico.

Evaluar la adherencia al tratamiento de los pacientes con patologías crónicas. Comparar la adherencia al tratamiento entre pacientes con patologías crónicas. Comparar la adherencia al tratamiento en relación al sexo en pacientes con patologías crónicas.

Materiales y métodos.

Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal durante el mes de agosto-septiembre del año 2019. Muestra no probabilística de tipo accidental. Muestra (n) 212 pacientes de ambos sexos de entre 18 a 90 años, con enfermedad crónica y tratamiento crónico. Se utilizó el Test de Morisky-Green de cuatro preguntas de respuesta dicotómica sí o no. El análisis de los resultados se realizó en InfoStat. Se utilizaron las variables cualitativas transformándolas en frecuencias absolutas y porcentajes para una mejor lectura y confección de tablas. Se realizó la prueba de Chi-cuadrado para identificar la relación de la adherencia al tratamiento con el sexo y la edad.

Resultado.

El 59% son mujeres (125) y 41% son varones (87), al valorar la adherencia al tratamiento el 13% adhería y el 87% no. Presentaron una única enfermedad crónica 79% y el 21% coexistían varias patologías crónicas.

Conclusión.

Existe una relación significativa entre la adherencia al tratamiento y el sexo. La principal causa de la no adherencia fue: "le sientan mal los medicamentos".

18. MORTALIDAD EN PACIENTES JÓVENES. IDENTIFICACIÓN DE CASOS, ETIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS EN PACIENTES MENORES DE 40 AÑOS.

Juan Andrés Ávila Quiroga, Daniel David Martínez, Gustavo Ariel Paz, Marco Antonio Quispe. – Cursantes Carrera Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. Enrique Vera Barros.

Introducción.

Objetivo: Evaluar la frecuencia de muerte por servicios, relacionando los síntomas, la localización y las distintas causalidades. Separando por sexo y edad.

Material y método: historias clínicas comprendidas entre 2018-2019.

Resultados: de 52 historias clínicas revisadas, 30 (58%) correspondieron al sexo masculino y 22(42%) al femenino. La edad media de presentación fue 29.04años. El motivo de ingreso más frecuente fue por traumatismo craneoencefálico.

Conclusión.

El TCE representa la principal causa de muerte en pacientes jóvenes en la ciudad de La Rioja.

19. NIVEL DE EMPATÍA EN ESTUDIANTES DE CICLOS CLÍNICOS DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FUNDACIÓN H.A BARCELÓ SEDE LA RIOJA.

Chehuan, Matias Gabriel; Rovalletti, Nicolás. IUCS Fundación H. A. Barceló- Cursantes Carrera de Medicina.

Introducción.

Determinar el nivel de empatía en los estudiantes avanzados de la facultad de Medicina Fundación Barceló Sede La Rioja

Material y Método.

Se realizó un estudio exploratorio de corte transversal aplicando la escala de empatía medica de Jefferson. Se aplicó este sistema de recolección de datos junto con un consentimiento informado para determinar el nivel de empatía y compararlos con variables como: sexo y ciclo clínico

Resultados.

Se realizaron 241 encuestas en estudiantes de Medicina, estratificados por ciclo. Según el género el 52, 8 % (126) fueron femeninas y 47,7 % (115) masculinos. El promedio de edad fue de 24 años. Los resultados muestran diferencias en el Nivel de Empatía a favor del sexo masculino y de los ciclos clínicos inferiores, pero estas no son estadísticamente significativas

Conclusiones.

Es necesario repetir el estudio a fin de establecer con mayor confiabilidad las diferencias encontradas que permitan proponer estrategias para incorporar esta

habilidad emocional en el aprendizaje de los estudiantes de medicina.

20. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL NIVEL SUPERIOR, DE LA CARRERA DE HEMOTERAPIA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA, AÑO 2018.

Dr. Aredes, Rafael. Facultad de Ciencias de la Salud. UNCA

Introducción.

La Formación docente y la evaluación del aprendizaje, y en cualquier nivel educativo que se lleve a cabo, tiene tras de sí una visión particular del acto de educar, una óptica epistemológica alrededor de la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento. La evaluación del aprendizaje es un proceso complicado, que inciden en una u otra forma sobre el mencionado proceso evaluativo.

Objetivos

Analizar el proceso de la formación docente respecto de la evaluación de aprendizaje de las asignaturas de la carrera Tecnicatura en Hemoterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, año 2018

Metodología.

Encuesta semiestructurada a estudiante (último año) y docentes de la carrera de hemoterapia Análisis de la Planificación curricular. Rastreo bibliográfico. Docentes N 22 y n 17. Estudiantes N 38 y n 38 RESULTADOS Sexo igual 11 Y 11, Edad: dominan mayor de 40 años 13/22. Según profesiones Médicos 9/22, Licenciado 5/22 Técnicos 4/22. Docentes por año de carrera 3er año: 8/22 y 1er y 2do año 7/22. 90% de docentes son interinos, un 10% concursado. titulares (3/22) la mayoría adjuntos (16/22). Respecto a la dedicación Semi-exclusivo y Simple (11 y 10 respectivamente) y muy poca exclusivos (full-time). antigüedad en la materia de 0 a 5 años y antigüedad en docencia 0 a 10 años. Tipo evaluación 49% sanativa **Conclusiones.**

La encuesta y la planificación curricular optaron por la enseñanza y evaluación del -aprendizaje responde a la manera tradicional y no buscar una alternativa que mediante la metodología innovadora en instrucción y evaluación optimice la formación del alumno Que una mera calificación no sea el éxito o fracaso del estudiante. Desde la clasificación de evaluación es de tipo sumativa, que se valora final o parcial (un numero). Que sea una verdadera valoración, que evitaría el índice de deserción.

21. PARTO PRE TERMINO. RELACIÓN CON EL EMBARAZO ADOLESCENTE.

Luciana b. Carrasco; Florencia Anabella Nieto; Brenda m. Rodríguez López; Myriam de los a. Zurita Brunello. –Hosp. De la madre y el niño. La Rioja 2019- cursantes carrera de medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: Evaluar la prevalencia del parto pre termino en contexto de embarazo en la población atendida en el Hospital de la Madre y el Niño entre el año 2014 al año 2019.

Material y método: Se utilizaron historias clínicas y carnet perinatal de pacientes que presentaron diagnóstico de parto prematuro.

Resultados: De 1830 embarazos de pacientes entre 10 y 18 años, 125 concluyeron en parto pre termino desencadenado por diversas patologías.

Conclusiones.

Se observó que la patología tiene origen multifactorial y a prevalencia de embarazo adolescente es menor que la media nacional.

Palabras claves: embarazo- adolescente- parto prematuro- gestación.

22. SÍNDROME DE SUPERPOSICIÓN LUPUS ERITEMATOSO SINTÉTICO Y HEPATITIS AUTOINMUNE. OVERLAP SYNDROME.

Dr. Juan Antonio Flores; Dra. Meinardi, Mónica. Servicio de Reumatología- Hosp. Enrique Vera Barros. La Rioja.

Introducción.

La coexistencia de LES y Hepatitis Autoinmune se ha descrito de forma ocasional.

Poseen características comunes: poliartralgias, hipergammaglobulinemia y ANA (+), pero se trata de entidades diferentes

CASO CLINICO:

Paciente de 15 años con diagnóstico de LES, inicia cuadro de ictericia y síndrome febril, elevación de enzimas hepáticas, con ANA, anti DNA, Ro, La y anti LKM 1 positivos (+). -

cuadro Previo: edema bipalpebral, fiebre de 38+, sin foco, síntomas sistémicos, fatiga, anemia, exantema palmar, poliartritis, edema MMII con Godet positivo. aparición de livedo reticularis. 7 días después cuadro de FAE y ortopnea

24 hs después taponamiento cardíaco.

Laboratorio: C3 C4 bajos y anticuerpos Anti Sm Neg
Anti Ro Neg Anti La Neg ANA positivos (+) (>1/80)

Se realizan 3 pulsos de esteroides

BpRenal nefropatía clase IV.

Depósitos de: IF: IgG – IgA mesangio y mb; IgM –
mesangio

C3 y C1q mesangio y mb

1 año despues Internada por Corea

Tratamiento: Haloperidol 1mg c/8hs

CF ev 1g/m2 y pulsos de corticoides y continuó con 1
g/día de MF e HCL 400mg/día

Ascenso de enzimas hepáticas GOT: 97 UI/L; GPT: 301
UI/L, sin signos clínicos. -

A los Dos años, ictericia, artralgias, y elevación de
enzimas hepáticas; repositivizó el anti-ADN doble
cadena, caída del C4 y presencia del anticuerpo anti-
LKM1.-

Sin antecedentes transfusionales. Serológica paravirus
hepatotropos, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr,
fueron negativos.

Anticoagulante LúpicoPositivo.

Cuadro de Ictericia severa, coluria, acolia y prurito. tto
con Azatioprina 75 mg/día

Bp Hepatica: Hepatocitos con cambios regenerativos,
balonización y degeneración plumosa; pigmento biliar,
infiltrado linfoplasmocitario con PMN. Puentes de
fibrosis y cuerpos apoptoticos.

Discusión.

La coexistencia del LES y la HAI, Síndrome de
Superposición u Overlap, es una rara observación.

El aumento de transaminasas es frecuente en LES, 23%
al 55% de los pacientes, leve y probablemente
multifactorial.

La HAI es una enfermedad progresiva del Hígado, de
causa desconocida que se presenta en niños y adultos
de todas las edades, caracterizada por la elevación de
las enzimas hepáticas, hipergammaglobulinemia con
presencia de autoanticuerpos y hallazgos histológicos
característicos.

Cuadro Clínico insidioso: síntomas inespecíficos.
Artralgias, letargo, erupción cutánea, náuseas, dolor
abdominal...

Las dos enfermedades difieren en su fisiopatología.

Conclusiones.

La HAI puede desarrollarse en pacientes con
diagnóstico de LES.

La coexistencia de ambas entidades obliga a un
diagnóstico preciso, apoyado en hallazgos histológicos
del hígado.

Debe sospecharse en pacientes con LES que presenten
anormalidades de enzimas hepáticas, con
autoanticuerpos marcadores, como ANA, SMA y/o
anti-LKM. Un diagnóstico precoz es importante para

ajustar el tratamiento y prevenir el avance de la
enfermedad hepática.

23. ENFERMEDAD DE BERGER. PURPURA PERSISTENTE. NEFROPATÍA IGA. –

Dr. Juan Antonio Flores; Dra. Meinardi, Mónica.
Servicio de Reumatología- Hosp. Enrique Vera Barros.
LR.

Introducción.

La nefropatía por IgA es una glomerulonefritis inmune
que involucra un grupo heterogéneo de pacientes con
diferentes presentaciones clínicas.

Los depósitos de IgA en el mesangio están presentes en
cerca de 1,3% de la población general. Es una forma
común de glomerulonefritis mediada por complejos
inmunes.

Caso clínico

Paciente de 14 años fem que consulta por lesiones en
piel, purpúricas, en superficies extensoras de mss y
mmi, vitropresión negativa.

Episodio de hemorragia digestiva alta con realización
de FEDA: Gastritis erosiva. Y episodios intermitentes de
epiescleritis en dos ocasiones.

Desarrollo HTA, y episodios de dolor torácico
moderado con estudios cardiológicos y pulmonares
negativos.

Es tratada con esteroides a dosis inmunosupresoras al
inicio y adición posterior de Mofetil Micofenolato. -

Analítica Sanguinea: dentro de parámetros

Sedimento urinario: Hematuria franca a los 6 meses de
inicio del cuadro

Ecografía renal: Normal

Biopsia renal: depósito mesangial hialino, apiñamiento
de núcleos por proliferación mesangial y colapso de
capilares con focos de necrosis. La IF mostró depósitos
de Ig A.

Microscopia: cilindro renal con 17 glomérulos. Se
realizó IF para IGGlgAlGM C3 C1Q kAPPA y Lambda.

Glomérulos: 17 glomérulos ninguno globalmente
esclerosado

Intersticio: inflamación intersticial leve por
mononucleares, y leve fibrosis intersticial.

Discusión.

Inicialmente fue considerada como un proceso
benigno; 30-50% de pacientes pueden evolucionar a
falla renal crónica.

Curso clínico variable, menos del 5% presentan
remisión completa, el 50% presentan un curso benigno
y tienen IgA sérica persistente, 10% curso maligno, y
30-40% curso progresivo.

Mal pronóstico: Edad tardía, HTA, síndrome nefrótico, hematuria, síntomas sistémicos, y genéticos como, HLA, etnia e historia familiar.

En enfermedad severa, debería tratarse con glucocorticoides, citotóxicos y/o plasmaféresis.

Conclusiones.

La nefropatía Ig A está determinada por la afectación renal expresada por el grado de hematuria y el impacto de la función de filtrado, puede no presentarse hematuria como signo guion, en pacientes que por su grupo étnico poseen diagnósticos probables para varios subtipos de vasculitis y/o enfermedades autoinmunes intercurrentes.

24. ENFERMEDAD OCULAR EN PACIENTES DIABÉTICOS, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN.

Natalia Soledad Alonso Vila; Luis Esteban Fleming Saravia, Ricardo Antonio Urtubey. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Llegar a un diagnóstico oportuno de la retinopatía, establecer el estadio y su tratamiento correspondiente.

Identificar prevalencia según sexo y edad.

Material y método: se utilizaron historias clínicas de pacientes con diagnósticos de retinopatía diabética, estudios de la agudeza visual e imágenes.

Resultados.

El estadio no proliferativo moderado es el de mayor prevalencia, la doble terapia con fotocoagulación y antiangiogénicos demostró ser la más efectiva.

Conclusiones.

Al momento del diagnóstico la mayor parte de los pacientes acuden con enfermedad ocular avanzada.

Se debe reforzar control oftalmológico al momento del diagnóstico de diabetes.

Palabras claves: enfermedad- ocular- diabetes- retinopatía- estadio- tratamiento.

25. RETINOPATÍA EN EL ADULTO, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PRESENTACIÓN Y ESTADIFICACIÓN PARA EVALUAR EL GRADO.

Daniel Sarquis; Fiana Carolina Santos Da Conçencao; Damián Emanuel Tejerina. Cursantes Carrera Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló. FUNDANO LA RIOJA.

Introducción.

Objetivo: clasificación de la retinopatía diabética en pacientes adultos según sus distintos estadios de

presentación y prevalencia de la enfermedad según sexo, la edad y clínica de presentación.

Material y método: se realizaron consulta con profesionales y se utilizaron historias clínicas de pacientes de ambos sexos mayores de 18 años con diagnóstico de retinopatía diabética.

Resultados: la prevalencia de pacientes con diagnóstico de retinopatía diabética en estadios severos ocupa casi la mitad de las historias clínicas revisadas, con mayor número de casos entre los 50 a 60 años de edad y en el sexo femenino. El síntoma que prima es la disminución de la agudeza visual.

Conclusiones.

La presentación de retinopatía diabética teniendo en cuenta el sexo, informa que en su mayoría los pacientes afectados son del sexo femenino con una pequeña prevalencia sobre el sexo masculino.

De los distintos motivos de consulta la mayoría de los pacientes refirió disminución de la agudeza visual (70%). Otros síntomas de menor frecuencia fueron pérdida repentina de la visión nocturna.

Al clasificar la retinopatía diabética en sus distintos estadios se demostró una prevalencia del estadio severo.

Palabras claves: retinopatía diabética- estadios- consulta oportuna- prevención.

26. ASMA: POLIMORFISMOS RELACIONADOS CON LA PREDISPOSICIÓN A LA PATOLOGÍA EN NIÑOS DE CÓRDOBA.

Rodríguez M; Dra. Orellana J; Skrie V; Pogonza E; Muiño J C; Lauria M J; Blanco A; Pereira B M I- HOSP. DE NIÑOS DE CORDOBA.

Introducción.

El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas de variados fenotipos que han sido identificados con el uso de criterios clínicos (Wenzel 2006). Aunque poco se conoce acerca de las causas que le dan origen se sabe que su aparición obedece a una combinación de factores genéticos y medioambientales. En la actualidad hay más de 300 millones de personas con asma y, en las últimas décadas, se transformó en una afección muy común en la población pediátrica donde la mayoría de las exacerbaciones obedecen a desencadenantes externos. En la actualidad, a través de un amplio estudio de genoma, se han detectado polimorfismo de nucleótidos únicos (SNP) como marcadores asociados a la patogénesis del asma en poblaciones infantiles de diferentes etnias. Entre estos polimorfismos se destacan, por su alta asociación con la enfermedad, el rs7216389 detectado en el gen

ORMDL3 en el cromosoma 17q21 (Moffat et al.) y el rs2786098 en el gen DENNDIB del cromosoma 1q31 (Sleinman et al).

El objetivo fue determinar la presencia de dos SNP (rs7216389- cromosoma 17q21- y rs2786098 – cromosoma 1q31) en niños con diagnóstico de asma en la División de Alergia e Inmunología, Hospital de Niños de Córdoba.

Materiales y Métodos

El estudio fue realizado de acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud (CIEIS) del niño y del adulto del polo sanitario. Se estudiaron niños de ambos sexos, menores de 18 años, con diagnóstico de asma, según la información obtenida en la anamnesis, examen físico y PRICK test fueron incluidos como grupo problema (GP) (n=32). El grupo control (GC) (n=28) fueron niños menores de 18 años. Luego que los padres firmaron el consentimiento informado y los niños mayores a 7 años dieron su asentimiento para participar del trabajo, se tomaron muestras de sangre para la extracción de ADN, realización de PCR y la determinación de los SNP rs 7216389 y 2786098 a través de la digestión con enzimas de restricción Nsil y HhaI respectivamente. Del análisis de restricción se obtuvieron las frecuencias de los diferentes genotipos en los grupos estudiados. Los alelos con sitio de corte se designaron n y h para Nsil y HhaI y sin sitio de corte N y H para Nsil y HhaI respectivamente.

Los datos se analizaron por medio de un software SPSS para Windows XP versión 17 (SPSS, Inc, Chicago, IL, U.S.A.). Se utilizó el test de Chi cuadrado para comparar las frecuencias genotípicas observadas con aquellas esperadas en caso de cumplirse el equilibrio de Hardy Weinberg. Las asociaciones de los genotipos correspondientes a los diferentes sitios polimórficos con los factores medioambientales se analizaron mediante el test de ANOVA. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando $P < 0,05$.

27. PIE DIABÉTICO, INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y HEMODINÁMICA CON ANGIOPLASTIA.

M. Lourdes Altamiranda; Paula Melina Amaya; Carolina R. Brandan; Marianela Corona. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. La Rioja

Introducción

La Diabetes Mellitus es considerada una enfermedad metabólica crónica y compleja que se caracteriza por

deficiencia absoluta o relativa de insulina que cursa con hiperglucemia crónica y alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos; ello a su vez puede originar múltiples complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica, así como también frecuentemente produce complicaciones macrovasculares.

El pie diabético es una complicación macrovascular, que se define como la infección, ulceración y la destrucción de los tejidos profundos, asociados con anormalidades neurológicas (pérdida de la sensibilidad al dolor) y vasculopatía periférica de diversa gravedad de las extremidades inferiores. Representa mayor prevalencia de amputación del 14 al 20 %, con recurrencia de lesiones del 79% a los 3 años y una tasa de mortalidad del 70% a los 5 años.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Se seleccionó 637 historias clínicas de pacientes que tuvieron complicaciones macrovasculares asociadas a Diabetes Mellitus Tipo 2 a nivel de miembros inferiores (pie diabético) de ambos servicios de cirugía del Hospital Enrique V. Barros y Sanatorio Rioja, en este último, también se recolectó datos del servicio de hemodinámica. En el periodo del año 2017 al 2019. Se observó que cuantitativamente del total de la población estudiada, los sexos masculinos son quienes requirieron mayor tratamiento quirúrgico y hemodinámico de las complicaciones de pie diabético con un porcentaje del 75% (478).

Como resultado del trabajo en orden de frecuencia los tratamientos más realizados fueron toilette, amputación y bypass.

Palabras claves: diabetes mellitus, pie diabético, complicaciones, hemodinamia, angioplastia, stent, bypass, toilette, amputación.

28. APENDICITIS AGUDA PEDIÁTRICA.

María José Ángeles, Mercedes Giménez, Roció Guchea, Samanta Quinteros. - Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: evaluar la incidencia de apendicitis aguda pediátrica, relacionándola con la edad, el sexo, los síntomas, los hallazgos del laboratorio, el tipo evolutivo, los antibióticos y los días de internación requeridos.

Material y método: se utilizaron historias clínicas de pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda del Servicio de Pediatría. Se calcularon promedios y frecuencia para las distintas variables.

Resultados: edad media: 10años; sexo más frecuente: masculino; síntoma más frecuente: dolor abdominal, tipo evolutivo más frecuente: flegmonosa.

Conclusiones: la presentación de la enfermedad coincide con otros estudios. Hay diferencias entre el sexo, con predominio sobre el masculino.

Palabras claves: apendicitis, sexo, edad, síntomas, laboratorio, tipo evolutivo, antibiótico.

29. NEUMONÍA EN PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS. CLÍNICA, CLASIFICACIÓN Y MOTIVO DE EGRESO.

Juan Estévez Robles; Ignacio Ponce de León; Christian Sotelo; Gonzalo Zarate. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB. La Rioja

Introducción.

Objetivo: Evaluar la presentación clínica de la neumonía, su relación con la clasificación y su motivo de egreso, separándolo por sexo.

Material y método: se utilizaron historias clínicas y fichas de consultorio de pacientes que presenten el diagnóstico de neumonía entre los periodos de junio 2018-junio 2019.

Resultados: más prevalentes en sexo masculino; síntomas más frecuentes es la disnea; motivo de egreso principal es el alta hospitalaria; diferencias según sexo significativas.

Conclusiones: La presentación de la enfermedad coincide con otros estudios. Hay diferencias entre sexo.

Palabras claves: neumonía, comunidad, síntomas, presentación, clínica, intrahospitalaria.

30. PREVALENCIA DE MACROSOMIA EN NEONATOS. FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN A ESTA ENFERMEDAD.

Agustina Rocío Alarcón; Rosilene Lima Cavalcante; Fagner De Brito Pereira; Valentina Andrea Naveas Hermosilla. Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. de la Madre y el Niño.

Introducción.

Objetivo: Evaluar la prevalencia y factores de riesgo para macrosomía en neonatos de la ciudad de La Rioja.

Material y método.

Se revisaron 882 historias clínicas de los pacientes atendidos en el Sector de neonatología del Hospital Madre y Niño con lo cual 76 de estos son diagnosticados con macrosomía, que corresponden al

periodo del mes de enero a abril de 2019. Se seleccionaron aquellos pacientes que tuvieran diagnóstico de macrosomía con peso de más de 4.000g. De los pacientes que nacieron en el servicio de neonatología del hospital se rescataron las historias clínicas y se completó la información faltante.

De la casuística estudiada, un total de número de pacientes pudieron ser analizados. Se calculó el porcentaje de varones y mujeres que presentaron esta patología, la edad media materna, los factores de riesgo como la obesidad. Se investigaron diferencias entre mujeres de cada edad los factores de riesgo y la prevalencia en el tiempo determinado.

Resultados: Edad media materna 27 años, 76 de 882 pacientes son macrosómicos, existe un predominio para sexo masculino y el sobrepeso y la obesidad es el factor de riesgo que prepondera. Diferencias de talla, no significativas.

Conclusiones.

La prevalencia de macrosomía en neonatos en la muestra estudiada es de 8,6 %.

La edad materna media de presentar un hijo con estas características en este estudio fue de 27 años. Dentro de los factores de riesgo se vio que madres con sobrepeso y obesidad desarrollaron neonatos macrosómicos en un 66,56% de los casos.

Mujeres con bajo peso no demostró un riesgo significativo para desarrollar hijos con esta patología. La relación entre los sexos, demostró un predominio del sexo masculino con respecto al sexo femenino.

Palabras claves: macrosomía, neonato, factores de riesgo, prevalencia.

31. ESTADÍSTICA DE LAS INFECCIONES POR ESCABIOSIS EN NIÑOS DE HASTA 15 AÑOS DESDE EL AÑO 2012 AL 2019.

Valeria López; Héctor Claudio Servant. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. CAPS Nancy Gallegos, La Rioja.

Introducción.

Objetivo: Evaluar la estadística de las infecciones por escabiosis en niños de hasta 15 años. Determinar sexo predominante, edad, comparación bianual de cantidad de casos y porcentajes, condiciones de hábitat con necesidades básicas insatisfechas o satisfechas y rango etario más afectado.

Material y Método: Se utilizaron historias clínicas y fichas de consultorio de pacientes que presentaron el diagnóstico de escabiosis en el CAPS Nancy Gallegos, La Rioja.

Resultados: Edad media 5,6 años; sexo más frecuente: masculino; hábitat con NBI; la evolución bianual

mostró incremento en 2018-2019. Los casos identificados por rangos etarios fueron: recién nacidos 0, lactante menor 2, lactante mayor 3, pre escolar 9, escolar 4 y adolescentes 3 casos.

Conclusiones.

La edad media de presentación de escabiosis en la muestra estudiada es de 5,6 años.

La prevalencia en el sexo masculino es mayor que en el femenino, sin una diferencia significativa.

Las características del hábitat son viviendas sin necesidades básicas satisfechas.

El mayor porcentaje de casos se observó en el periodo 2018-2019 con un 51 % del total.

Se observó que la mayor cantidad de casos se presentaron en la edad pre-escolar.

Palabras claves: estadística, infecciones, Escabiosis, niños, hasta 15 años, 2012 a 2019, sexo, hábitat, incremento, bianual, rango, etario.

32. PAEDERISMO: UNA PATOLOGÍA EMERGENTE EN LA RIOJA

L Ballarino¹, C Bizzotto², E Euliarte¹, G Bonini¹, SG Rodríguez Gil³. Ministerio de Salud Publica La Rioja.

Introducción.

El paederismo es una patología que ha sido poco descripta para el país, y que apenas abarca media página en los animales venenosos descriptos por el Ministerio de Salud de la Argentina. El responsable es

un insecto del orden Coleoptera, familia Staphylinidae, del genero Paederus. Vulgarmente en nuestro país se lo conoce como “bicho del fuego” o “bicho de los vigilantes”.

Las laceraciones que producen en la piel los Paederus son causadas por una amida conocida como paederina o pederina.

Es una sustancia toxina cristalina de potente acción caustica y vesicante, soluble en agua y alcohol capaz de bloquear la mitosis celular y la síntesis de ADN.

Objetivo: describir casos de Paederismo ocurridos en la pcia de La Rioja.

Materiales y métodos: se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional en la estación de verano de los años 2016 y 2017, se revisaron las historias clínicas de 15 pacientes del Hosp. De la Madre y el Niño de la capital de La Rioja que consultaron por lesiones de piel, analizando tipo de lesión, localización, tratamiento y contacto con el posible agente causal.

Resultados: todos los pacientes estudiados consultaron con lesiones eritemato-vesiculares en su inicio y luego evolucionaron a lesiones ampollares con necrosis central. La primera consulta se realizó con 24hs y hasta 3 días (80%) de evolución. La curación fue

realizada con crema con neomicina (expuesta) o con sulfadiazina de plata (oclusiva) dependiendo de la extensión y localización. Todos los pacientes presentaron las lesiones características en espejo o en latigazo y en zonas expuestas como miembros y cuello. Todo lo expuesto se dio en un contexto climático propicio para la aparición y reproducción del insecto.

Conclusión: al no ser una patología propia d la zona, no se conocía la relación entre el agente causal y la patología, lo que llevo a que algunos casos generaran confusión en el diagnóstico, y se interpretaran como loxoscelismo, por lo cual fueron tratados en forma errónea. Un diagnóstico certero con un tratamiento adecuado, en forma tópica, ya que se trata de una quemadura química de tipo A de la clasificación de Benaim, donde se pierde la barrera epidérmica, es suficiente como para prevenir la sobreinfección y por lo tanto prolongar los tiempos de curación y la secuela, evitando así los tratamientos sistémicos con antibióticos y/u otros innecesarios como sueros antiloxosceles. A la vez de informar, se plantea la necesidad de alertar a los profesionales de la salud y a la población, acerca de la existencia de este insecto, ya que con medidas simples se puede prevenir la dicha patología como, por ejemplo:

*Colocación de mallas en puertas y ventanas.

*Uso de repelentes.

*No aplastar el insecto sobre el cuerpo.

*Retirarlo cuidadosamente con una hoja o elemento similar o soplarlo.

33. TEST DE FINDRISK EN ALUMNOS DE LA FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ

C. Sabriny Gomes Borges, Jéssyca T. De Araújo Alves-Cursantes Carrera de Medicina. - IUCS Fundación Héctor A. Barceló- sede La Rioja.

Introducción.

Este es un estudio transversal, descriptivo, piloto, en el cual se hicieron 200 Test de Findrisk, propuesto por la ADA y la OMS para determinar el riesgo de padecer diabetes, en alumnos de la Fundación Barceló, Sede La Rioja, mayores de 18 años, de todas las carreras, entre los meses de abril a septiembre de 2019, teniendo en consideración la ausencia de un diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2.

Material y método: Fueron utilizados como materiales una balanza para el peso, cintas métricas para medir talla y perímetro abdominal, y fichas impresas del Findrisk. Con la suma de los puntos de cada parámetro analizado en el Test, se estratificaron de acuerdo a las recomendaciones pautadas.

Resultados: un 60,5% presento riesgo bajo, 26% aumentado, 10% moderado, 3% alto, 0.5% muy alto de desarrollar Diabetes en los próximos 10 años; 95,5% son < 35 años, 4% de 35 a 44 años, 0.5% de 45 a 54 años, 64% mujeres, 36% varones; 16% presentan sobrepeso, 12% obesidad; 68,5% con antecedentes familiares de diabetes, 11% que le han recetado medicamentos para la hipertensión o tiene hipertensión; 9.5% antecedente de hiperglucemia, 56% relataron comer frutas/verduras/integrales diariamente; 80% no realiza actividad física diaria.

Conclusiones.

Los resultados obtenidos fueron similares al de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, con relación a la prevalencia de hiperglucemia o Diabetes, que fue de 12.7% IC (12,1 - 13,4), cifra aproximada a la suma de aquellos con riesgo moderado, alto, y muy alto, de este trabajo (13,5%). Luego de hacer el test un alumno cuyo el resultado fue muy alto, busco hacer un control médico, que resulto en su diagnóstico de diabetes.

Palabras claves: riesgo, diabetes. Findrisc, pesa, talla, sexo.

34. CALIDAD DE VIDA EN LA ANTICOAGULACIÓN, IMPACTO EN LO COTIDIANO DE PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES.

Henrique Faustino Periné; Víctor Ferras; Fredy Emanuel Díaz. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: evaluar el impacto en la calidad de vida en pacientes bajo terapia anticoagulante e identificar sus principales limitaciones cotidianas.

Material y método: se realizaron encuestas anónimas del tipo “cuestionario de salud” a 96 pacientes anticoagulados.

Resultados: edad media, 61 años; enfermedad más frecuente la TVP, 82% percibieron cambios positivos en 1 año, con una diferencia significativa de mujeres en relación a los hombres. 11% experimentan niveles de limitación cotidiana. 48% dijo no haber limitaciones.

Conclusiones

Como conclusión de nuestro trabajo vemos que los pacientes estudiados demuestran satisfacción con el uso de la terapia y cambios poco significativos en la calidad de vida. La patología más común la Trombosis Venosa Profunda seguida de cerca por la Fibrilación Auricular. Gran cantidad de ellos notaron mejoría en su salud en el último año donde casi la mitad refieren no presentar limitaciones en lo cotidiano.

Palabras claves

Calidad de vida, anticoagulante, anticoagulación, cotidiano, impacto.

35. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN EDAD ESCOLAR PRIMARIA DEL AREA CAPS BENITO MONTOYA. –

Maximiliano Enrique Carrizo Rearte; Carla Irina Castillo. Cursantes Carrera Lic. en Nutrición. - IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de edad escolar e identificar causas y factores de riesgo.

Materiales y método: se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional, utilizando datos estadísticos.

Resultados: de 454 pacientes, 216 presentaron sobrepeso y obesidad con mayor prevalencia en el sexo masculino.

Conclusiones.

La presentación de la enfermedad coincide con otros estudios. No hay diferencias entre sexo. Se debe estudiar más casuística.

Palabras claves: sobrepeso infantil, mal nutrición, sedentarismo, obesidad infantil, causas de sobrepeso.

36. BRONQUIOLITIS EN PACIENTES DE PEDIATRÍA.

Teresa Gabriela Escobar Cáceres, María Macarena Manrique; Luis Guillermo Panozo Tuquina; Evelin Wagner; Laura A. Allende. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el Niño.

Introducción.

Objetivo: evaluar la estadística e incidencia de bronquiolitis en pediatría y sus características. Establecer diferencias entre masculino y femenino. Agentes más frecuentes.

Material y método: se utilizaron historias clínicas de pacientes con diagnóstico de bronquiolitis. Se calcularon promedios y frecuencias para las distintas variables.

Resultados: edad media, de 0-1 año; síntomas más frecuente sibilancia y tos, el agente más frecuente, VSR. Diferencias en sexo, no significativas.

Conclusiones: la presentación de la enfermedad coincide con otros estudios. No hay diferencias significativas entre sexo. Se debe estudiar, más casuística. **Palabras claves:** estadísticas, incidencia, bronquiolitis, agentes más frecuentes.

37. UEMADURAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS MENORES DE 14 AÑOS.

-Angélica María Angulo Zuleta; Macarena Agostina Autalan Núñez; Fernando Paredes; Guadalupe Soto. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el Niño.

Introducción.

Objetivo: Evaluar el total de niños con diagnóstico de quemaduras que concurren al Hospital de la Madre y el Niño entre enero del 2018 y agosto del año 2019, las edades más frecuentes, causas, zonas de piel afectadas y el número de niños que necesitaron cirugía reconstructiva con injerto de piel.

Material y método: se analizaron historias clínicas de pacientes que concurren a la guardia o que fueron internados en todo el año 2018 hasta agosto del año 2019.

Resultados: la edad mayormente afectada son los < 5 años, las causas más frecuentes fueron por líquidos calientes y fuego; las zonas más comunes fueron cabeza, cara y cuello, y un 1.4% de los atendidos requirieron cirugía reconstructiva con injerto de piel.

Conclusiones: la edad, causas, y zonas más comunes coinciden con otros estudios.

Palabras claves: quemados, niños, causas, edad, zonas, reconstrucción, injerto.

38. QUEMADURAS ACCIDENTALES POR FRICCIÓN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE 2 A 12 AÑOS.

-Ana Laura Arguello; Fernando Gabriel Bulacio; Ana Carolina Cardozo. - Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. Hosp. De la Madre y el Niño.

Introducción.

Objetivo: evaluar la presentación de las quemaduras accidentales por fricción en niños entre 2 a 12 años teniendo en cuenta

las características clínicas y epidemiológicas.

Método y material: se utilizaron historias clínicas y fichas de consultorio de pacientes con quemaduras por fricción.

Resultados: el sexo ocupa el primer lugar en cuanto a localización, con mayor incidencia el MMII en ambos géneros.

Conclusiones: la incidencia es mayor en varones sobre mujeres, en cuanto a localización tiene mayor prevalencia en miembros inferiores, debido a que la primera causa es por accidentes de motocicleta.

Palabras claves: quemaduras, fricción, epidemiología, sexo, localización.

39. RETINOPATIA EN RECIÉN NACIDOS PREMATUROS Y SUS CARACTERÍSTICAS.

Carla Rocío Carrizo; Diamela Cristal Carrizo; Indira Estofe Sousa. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: Determinar los casos de retinopatía del prematuro (ROP), sus grados de acuerdo a su peso al nacer. Número de pacientes tratados con láser y Avastin.

Material y método: se utilizaron historias clínicas de pacientes recién nacidos internados en el servicio de neonatología periodo 2013 a 2018.

Resultados: hubo 103 casos de ROP en 2013, 89 en 2014, 80 en 2015, 138 en 2016, 103 en 2017 y 108 en 2018.

Pacientes tratados 1 en 2013, 5 en 2014, 3 en 2015, 6 en 2016, 7 en 2017, 10 en 2018.

Conclusiones: según los datos recabados, se observó que los pacientes con grados I son más frecuentes en prematuros de 1000-1499gr, los grados más severos más frecuentes en prematuros menores de 1000gr. Hubo un aumento significativo de pacientes tratados con láser o Avastin a partir del 2016.

Palabras claves: parto, prematuro, retinopatía, edad gestacional, peso, ROP.

40. CÁNCER DE PRÓSTATA, INCIDENCIA, ESTRATIFICACIÓN SEGÚN SUS METÁSTASIS.

-Nicolás J. Ibaceta, Juan F. Kollrich, Norberto Bravo. -Cursantes Carrera de Medicina-IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: evaluar estado de clasificación según Gleason y PSA, estadificación de acuerdo a la metástasis de puntuación de Gleason en grupos simplificados.

Material y método: se utilizaron fichas de consultorio, historias clínicas e informes de anatomía patológica de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata. Se calcularon promedios y frecuencias de edad y grupos simplificados según escala de Gleason y frecuencia de metástasis.

Resultados: se observó que el intervalo de edad más frecuente con diagnóstico de cáncer de próstata es 60 a 70 años representando un total de 10 casos sobre 24 observados desde el año 2016 al 2019.

Conclusiones: de los datos observados en 24 historias clínicas de pacientes de distintas procedencias solo 6 presentaron metástasis de cáncer de próstata.

De estos 6 pacientes con metástasis 3 presentaron en Gleason 9 y 10 (grupo 5), 2 pacientes en Gleason 8 (grupo 4), 1 paciente en Gleason 6 (grupo 1). Ningún paciente presentó metástasis en el Gleason 7 (grupo 2 y 3).

Palabras claves: cáncer. Próstata. Estadificación. Metástasis.

41. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD, ASPECTOS CLÍNICOS Y DE LABORATORIO.

-María Pía Bissutti; Milton Colque; Mariana Fernández Boca Negra. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción

Objetivo: evaluar y establecer la prevalencia de las manifestaciones clínicas y

alteraciones en el laboratorio de pacientes que cursan con neumonía adquirida en la comunidad.

Material y método: se utilizaron historias clínicas del servicio de clínica médica con diagnóstico de NAC. Se calcularon frecuencias para las distintas variables.

Resultados: De 47 casos diagnosticados con NAC, 26 pacientes femeninos, 21 masculinos; del total 89.3 % tos con expectoración, el 70,2% disnea, 76,5% fiebre.

Lo más significativo del laboratorio es que de los 47 casos, 37 presentaron leucocitosis; 37 uremia elevada; 30 hiperglucemia; 35 pacientes presentaron hipoxemia.

Conclusión: En promedio el 78,6 presenta la triada característica de la enfermedad, fiebre, disnea, y tos con expectoración.

Del total de 47 pacientes revisados, 37 presentan leucocitosis y elevación de la urea en sangre. Un 63, 8 presenta hiperglucemia, el cual se usa como factor pronóstico de la evaluación de la enfermedad.

Palabras claves: Neumonía. Comunidad. Infección respiratoria. Síndrome de condensación.

42. PACIENTES DUALES, FACTORES DE RIESGO, CLÍNICA Y TRATAMIENTO.

-Ana Paula Grandi Rivera; Marcela A. Rodríguez; Sabrina Rojo; Samanta S. Santillán. -Cursantes Carrera de Medicina-IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. HEVB.

Introducción.

Objetivo: determinar la incidencia de pacientes que ingresan al servicio de Salud Mental por presentar una patología dual desencadenada por el uso de drogas psicoactivas.

Material y método: estudio retrospectivo consistente en el análisis de historias clínicas de pacientes duales.

Resultados: factor de riesgo: consumo de poli sustancias; forma de presentación: episodio psicótico agudo con auto y heteroagresividad.

Conclusiones: prevalece como enfermedad psiquiátrica la esquizofrenia; pacientes con bajo nivel socioeconómico; gran asociación con el consumo de poli sustancias psicoactivas.

Palabras claves: drogas. Enfermedades psiquiátricas. Edad. Sexo.

43. SÍNDROME COLEDOCIANO, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

Federico Quiroga, Maximiliano Tovar; Carlos Saravia Ibáñez, Hernán Josso. - Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción

Objetivo: evaluar la presentación del Síndrome coledociano, relacionándola con los síntomas, los diversos métodos diagnósticos y las distintas técnicas de tratamiento. Establecer diferencias entre hombres y mujeres.

Material y método: se utilizaron historias clínicas y fichas de consultorio de pacientes que presentaron el diagnóstico de Síndrome coledociano.

Resultados: de 350 historias clínicas revisadas, 54 pacientes presentan diagnóstico de síndrome coledociano.

Conclusiones: con la revisión de los casos se ha determinado que el diagnóstico de síndrome coledociano predomina más en pacientes del sexo femenino.

Palabras claves: Coledocolitiasis- Síndrome Coledociano- Video laparoscopia- ERCP.

44. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE PIE DIABÉTICO EN UN HOSPITAL PÚBLICO.

-Núñez, Gabriela Florencia; Rivadeneira Cinthia Yohana; Trejo Filipovich Carla Elina. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: determinar el número de pacientes diabéticos que ingresaron en el hospital público del pie ya instalada.

Material y método: se revisaron historias clínicas de pacientes diabéticos del servicio de cirugía y diabetes en el periodo del 01 de enero hasta el 30 de abril de 2019.

Resultado: Ingresaron 834 pacientes diabéticos al hospital público, con una incidencia del 12% de Pie diabético.

Conclusiones: la presentación del pie diabético coincide con la aparición de lesiones pre ulcerosas, en aquellos pacientes diabéticos ingresados en el hospital público.

Palabras claves: Diabetes- Pie diabético- Historias clínicas- Consulta- Incidencia y Prevalencia.

45. ALACRANISMO. PREVALENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS Y DE LABORATORIO.

-Fraccarolli Lucas Javier; Sanguineti Naharro Natacha Silvina. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: evaluar la presentación clínica de alacranismo en niños menores de 15 años y las complicaciones que requieren paso a utip.

Materiales y método: se utilizaron historias clínicas de pacientes que presentaron diagnóstico de alacranismo en el año 2017-2018.

Resultados: de 819 pacientes, 38 presentaron complicaciones con requerimiento de internación en utip.

Conclusiones: de los casos estudiados, se presentaron signos cardiotóxicos de grado variable que coincide con otros estudios.

Palabras claves: alacranismo, prevalencia, picaduras, consulta, internación, complicación.

46. HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES, ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y OTRAS.

- Dantur Adib Bernardo, Estremadoiro Micaela Patricia. -Cursantes Carrera de Medicina- IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: comparar hipertensión arterial, diabetes, enfermedades autoinmunes y otras en pacientes con y sin déficit de vitamina D.

Materiales y método: se revisaron historias clínicas en pacientes de 40-60 años con dosaje de vitamina D. fueron clasificados en pacientes con y sin déficit de vitamina D. **Resultados:** el déficit de vitamina D más frecuente en sexo femenino e hipertensión arterial, seguido de diabetes, enfermedades autoinmunes y otras.

Conclusiones: el déficit de la vitamina D se asocia con el desarrollo de hipertensión arterial, diabetes y enfermedades autoinmunes.

Palabras claves: vitamina D, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, neoplasias, infecciones crónicas.

47. PARASITOSIS. DETERMINACIÓN, PREVALENCIA EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA.

-Daza Rivera Gabriela; Scarabotti María Florencia. -Cursantes Carrera de Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja. CAPS Ofelia de Lozada. La Rioja.

Introducción.

Objetivo: determinar el número de casos positivo, la etiología más frecuente y la zona más afectada en niños menores de 6 años. **Material y método:** se utilizó historias clínicas, fichas de consultorio de pacientes pediátricos, técnicas de recolección de materia fecal y análisis de laboratorio.

Resultados: la mayor prevalencia fue en la zona virgen del valle y, la etiología más.

frecuente es Giardia Lamblia. Los síntomas frecuentes de presentación fueron, dolor abdominal, prurito anal y/o nasal, hallazgo del parasito en materia fecal.

Conclusiones: el mayor número de casos se registró en la zona Virgen del Valle, siendo positivos la Giardia Lamblia, coincidiendo así con las condiciones sanitarias deficientes de la zona.

Palabras claves: parasitosis, síntoma, edad, prevalencia.

48. PALIVIZUMAB “PROFILAXIS PARA LA INFECCIÓN GRAVE POR VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO EN PREMATUROS DE ALTO RIESGO”.

Castro Lujan, Juan Pablo Daniel; Machado, Rodrigo de Carlo; Villca Quispe, Cristian Alfredo. -Cursantes Carrera de Medicina IUCS Fundación H. A. Barceló La Rioja.

Introducción.

Objetivo: evaluar re internación de pacientes prematuros con factores de riesgo para infección de vía respiratoria baja causada por virus sincicial respiratoria, vacunados con Palivizumab.

Material y método: se utilizaron historias clínicas de pacientes prematuros con factores de riesgo para bronquiolitis por virus sincicial respiratorio.

Resultados: de 303 pacientes prematuros 48 (16%) pacientes fueron seleccionados para ser vacunados con Palivizumab., la edad gestacional al nacer más frecuente fue 29 semanas, el peso promedio de 1.165grs, la patología asociada más frecuente es la Displasia Broncopulmonar, 7 (15%) paciente discontinuaron el tratamiento, 2 (4%) pacientes fueron re internados por enfermedad en la via respiratoria baja ninguno estuvo relacionado con el virus sincicial respiratorio.

Palabras claves: Palivizumab- Virus Sincicial Respiratorio- Profilaxis- Prematurez- Bajo peso al nacer.